



## 孕婦 B 群鏈球菌篩檢

20 June 2016



eDucating the community by  
sHaring the eXpertise of the Medical culty

### 什麼是「B群鏈球菌」？

- ✚ B 群鏈球菌是一種常見的腸內菌，有 10 ~ 35 % 健康婦女的下腸胃道或陰道裡面可發現此菌的蹤跡，多數帶菌婦女並不會發病，也不需特別治療。

### 為什麼孕婦要做B群鏈球菌檢查？

- ✚ 最新研究顯示，台灣懷孕婦女陰道帶菌率為 17.2 %，感染 B 群鏈球菌的孕婦經過陰道生產，可能讓新生兒暴露於感染源，將近 1 % 新生兒因此發生感染。
- ✚ B 群鏈球菌是新生兒肺炎、敗血症和腦膜炎最常見的原因，也會引起早產、死產或是流產的問題，帶給寶寶極大的健康威脅。

### 檢查對象

- ✚ 懷孕 35 ~ 37 週即將生產孕婦，或者有早產現象之孕婦。

### 檢查方法

- ✚ 醫師以棉花棒從孕婦陰道、會陰及肛門直腸採樣，進行細菌培養。

### 檢查注意事項

- ✦ 檢查前請勿用清潔用品特意清洗陰部及肛門，以免破壞菌叢，影響檢驗結果。
- ✦ 檢查時必須上內診檯，請穿著輕便容易穿脫的衣服。
- ✦ 檢查報告約 5 ~ 7 天會出來，下次回診時，醫師會解釋檢查結果。
- ✦ 國民健康署於 101 年 5 月開始，於產檢第 7 ~ 9 次補助此項檢查費用。

### 孕婦有B群鏈球菌感染時，該怎麼辦？

- ✦ 當孕婦的 B 群鏈球菌檢查結果為陽性時，不需要太過擔憂緊張，只要在待產時施打抗生素治療即可。
- ✦ 2002 年起美國疾病管制局建議，孕婦接受 B 群鏈球菌篩檢，如果結果為陽性，只要在分娩 4 小時前接受有效的抗生素治療，即可有效減少寶寶被感染的機會，臨床上以盤尼西林抗生素為治療首選藥物。
- ✦ 因抗生素療程必須大於 4 小時，所以提醒第 2 胎以上的經產婦，如果您的 B 群鏈球菌檢查結果為陽性時，只要有出現落紅、破水或是規則陣痛，請盡快到急診檢查，以避免產程過快，無法完成抗生素療程，造成寶寶被感染機會增加。
- ✦ 萬一抗生素療程還未滿 4 小時，寶寶已經由陰道分娩出來，小兒科醫師將會為寶寶做預防性的治療。